



Blennorragie ou gonococcie

Symptômes: Brûlures et/ou écoulement jaune par la verge, le vagin, fièvre, douleur au bas-ventre.

Apparition des signes: 2 à 7 jours après la contamination.

Mode de transmission: Par voie sexuelle.

Diagnostic: Prélèvement génital.

Complications graves si non traitée: Risques de stérilité; atteinte du nouveau-né si la mère est infectée.

Chlamydioses

Symptômes: Le plus souvent aucun signe sinon brûlures, écoulement par la verge ou le vagin, fièvre, douleur au bas-ventre, voire angine.

Apparition des signes: 1 à 2 semaines après la contamination.

Mode de transmission: Par voie sexuelle.

Diagnostic: Prélèvement local.

Complications graves si non traitée: Risques de stérilité, de grossesse extra-utérine; atteinte du nouveau-né si la mère est infectée.

Hépatite B

Symptômes: Souvent pas de signes, fatigue, fièvre.

Apparition des signes: 2 à 8 semaines après la contamination.

Mode de transmission: Par voie sexuelle, par voie sanguine, par voie materno fœtale.

Diagnostic: Prise de sang.

Complications graves si non traitée: Risques de cirrhose et de cancer du foie; atteinte possible du nouveau-né si la mère est infectée.

Herpès génitale

Symptômes: Petits boutons douloureux en forme de bulles sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche, démangeaisons.

Apparition des signes: 1 semaine ou plus après la contamination.

Mode de transmission: Par contact sexuel entre les muqueuses même sans pénétration (contact bouche sexe et bouche anus), par contact direct avec les lésions.

Diagnostic: Prélèvement local et dans certains cas prise de sang.

Complications graves si non traitée: Risque de récurrence, atteinte grave du nouveau-né si la mère est infectée.

La trichomonas

Symptômes: Écoulement par la verge ou le vagin, brûlures, démangeaisons.

Apparition des signes: À partir de 1 semaine après l'infection.

Mode de transmission: Par contact sexuel.

Diagnostic: Prélèvement local.

Complications graves si non traitée: Risque de récurrence.





Papillomavirus

Symptomes: Lésions ou petites verrues (condylomes) sur les organes génitaux ou l'anus.

Apparition des signes: 1 à 8 semaines après la contamination.

Mode de transmission: Par voie sexuelle, par contact d'une muqueuse avec une zone du corps infectée (condylomes).

Diagnostic: Examen médical et frottis vaginal.

Complications graves si non traitée: Risque de récurrence, risques de cancer du col de l'utérus; atteinte du nouveau-né si la mère est infectée.

Syphilis

Symptomes: Chancre (petite plaie ou bouton indolore), éruptions sans démangeaisons sur la peau et les muqueuses.

Apparition des signes: 2 à 4 semaines ou plus après la contamination.

Mode de transmission: Par contact sexuel entre les muqueuses même sans pénétration (contact bouche sexe et bouche anus), par le baiser si présence d'un chancre au niveau buccal.

Diagnostic: Prise de sang.

Complications graves si non traitée: Atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux ; atteinte possible du nouveau-né si la mère est infectée, stérilité, avortements.

VIH/Sida

Symptomes: Souvent fièvre, éruption, fatigue, diarrhée

Apparition des signes: A partir de 15 jours après la contamination.

Mode de transmission: Par voie sexuelle, par voie sanguine, par voie materno fœtale.

Diagnostic: Prise de sang.

Complications graves si non traitée: Evolution possible vers le sida; atteinte possible du nouveau-né si la mère est infectée.

